

Waarnemingen

Jouke van der Zee zwerft door het hele Rijk van Nijmegen en maakt bijzondere natuuroptnamen. Ook op 't Zwanenbroekje is hij regelmatig te vinden. Bijgaande foto's, die hij dit jaar maakte, mochten wij over nemen. Waarvoor onze dank.



4 jan Grote Zilverreiger



26 jan Buizerd



29 april Visdieven



Kopmeeuwen



29 april Koekoek



4 juni Lantaarntjes



28 juni Weidebeekjuffer



28 juni TengereGrasjuffer



28 juni TengereGrasjuffer



28 juni TengereGrasjuffer

Uit het verslag van een fietstocht van de Vogel Werkgroep Nijmegen e.o. op 1 juni door Harry Nieboer.

“Daarna doorgefietst naar het Zwanenbroekje, waar de laatste tijd veel te zien is. Deze avond goed voor Grutto, Tureluur, Bergeend, Krakeend, mannetje Smient, Meerkoeten, een grote groep Spreeuwen en een Kleine Plevier. Even werd gesuggereerd dat er twee jongen bij waren (zelfs gedetermineerd als een jongetje en een meisje), maar dat bleek een grapje te zijn. Verder families Grauwe Gans, twee families Canadese Gans, waarvan één familie werd opgejaagd door een groepje kanovaarders.

Aan de overkant nog een Gele Kwikstaart (nu voor de hele groep zichtbaar) en een Visdiefje. De groep Grutto's werd nog aangevuld met een zestal nieuwe en even later kwam ook weer een Lepelaar invliegen. Mogelijk één van de Lepelaars waarvan vermoed wordt dat ze momenteel broeden op de Oude Waal. Dit was een geringd en genummerd exemplaar, maar geen van de aanwezigen durfde het aan om te zeggen of het om letters of cijfers ging...”

Uit de Gelderlander:

Persingen op stelten

vrijdag 27 augustus 2010



Zo'n 70 ooievaars zijn neergestreken op een weiland

bij Persingen in de Ooijpolder.

De afgelopen dagen verzamelden ze zich tussen de koeien, om daarna door te vliegen naar het zuiden waar ze overwinteren.

Waarschijnlijk blijven ze nog even in de buurt tot het weer opknapt.

In 2009 werd ook zo'n grote groep ooievaars waargenomen

in het gebied rondom Groesbeek en Kranenburg.

Ringslang op komst?

Op 't Zwanenbroekje leggen wij gemaaid plantenmateriaal op een grote berg. De hoop is dat op den duur ringslangen zich zullen vestigen. Ringslangen leggen hun eieren in zogenaamde broeihopen. Zij maken gebruik van de warmte die ontstaat door het vergaan van de opgetaste plantenresten. Daardoor komen de eieren uit.

In september meldde Dietrich Cerff van de Duitse natuurorganisatie NABU de vondst van een ringslang in het Kranenburger Bruch vlak over de grens. Waarschijnlijk is deze afkomstig uit het natuurgebied de Bruuk en via de Leijgraaf en de Groesbeker Bach in de Bruch terecht gekomen. Volgens Johan Thissen uit Groesbeek zijn in de Rijnstrangen ook af en toe al ringslangen waargenomen. Vermoedelijk zijn deze afkomstig van de Veluwe. `Nu maar hopen dat de ringslang zich echt gaat vestigen in de Duffelt en de Ooijpolder`. Wij zijn er klaar voor!

De Zwanenmossel en de bittervoorn: draagmoederschap in de polder



Bittervoorn



Zwanenmossel en bittervoorn

Op 't Zwanenbroekje vinden wij vaak de schelpen van de Zwanenmossel, het grootste schelpdier van Nederland. Vogels laten de schelpen achter nadat ze de inhoud verorberd hebben. Interessant is de samenwerking tussen de Zwanenmossel en de Bittervoorn. De Bittervoorn legt met haar legboor, die op de foto goed te zien is, haar eieren in de mantelholte van de mossel. Daar komen ze uit en de larven blijven in de mossel tot ze vrij gaan zwemmen. De mossel `bewaakt` als het ware het broed. Dat vermindert de mortaliteit. In de paartijd neemt een mannetje een geschikte mossel in bezit en verdedigt daaromheen een territorium tegen concurrenten. Het vrouwtje laat zich door de man naar de mossel leiden en steekt de legbuis in de uitstroomopening van de mossel. Dadelijk daarna geeft de man zijn sperma boven de mossel af. Na vier tot vijf weken zwemmen de jongen uit. De bittervoorn smaakt bitter waardoor predatoren deze vis mijden.

De mossels maken op hun beurt gebruik van vissen. Hun eitjes worden door via het water opgenomen zaadcellen bevrucht en ontwikkelen zich binnen de broedkieuwen van de moeder tot zo'n 300.000 larven. Deze worden in het water losgelaten en hechten zich aan de huid van vissen. Door een weefselwoekering omsloten veranderen ze daar in kleine mosseltjes. Dan vallen ze van de vis af en gaan op de bodem leven. Mossels filteren hun voedsel uit het water door met hun kieuwen te pompen. Ze kunnen meer dan tien jaar oud worden.



Algemene informatie:

Een bezoek aan 't Zwanenbroekje?

Interesse in een informatiefolder en/of de nieuwsbrief? j.h.swarte@hetnet.nl

Een eenmalige of periodieke donatie aan 't Zwanenbroekje?

Rekeningnummer 1279.60.724 ten name van stichting Vrienden van 't Zwanenbroekje,
Rabobank Rijk van Nijmegen.

Bereikbaarheid van 't Zwanenbroekje:

Vanaf het Trajanusplein in Nijmegen richting Beek/Kleve, N325. De eerste afslag rechts naar Ubbergen nemen. Parallel aan de verkeersweg blijven (Parallelweg) tot het punt waar de weg enigszins naar rechts buigt (begin Kasteelse Laan) en het fietspad rechtdoor gaat. Auto's en fietsers kunnen hier parkeren; voetgangers steken hier de weg over (**voorzichtig!**) naar het klaphekje.

Hierachter bevindt zich een landbouwweg en het toegangshek van 't Zwanenbroekje. De landbouwweg is ook te bereiken vanuit Beek, St. Hubertusweg, eerste afslag links